

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
КАФЕДРА ХІРУРГІЇ ТА АКУШЕРСТВА

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина

Спеціальність 211 Ветеринарна медицина

Ступінь вищої освіти Магістр

ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ
Завідувач кафедри, професор
_____ Киричко Б.П.
«____» _____ 2019 р.

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

тема: «Діагностика, лікування та профілактика алергічних
дерматозів у собак»

ВИКОНАВ: ЗДОБУВАЧ ВИЩОЇ ОСВІТИ

СТАДНІКОВА ВАЛЕРІЯ МИКОЛАЇВНА

КЕРІВНИК МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Панасова Тетяна Георгіївна,

доцент кафедри хірургії та акушерства

Полтава 2019 р.

РЕФЕРАТ

Тема роботи: «Діагностика, лікування та профілактика алергічних дерматозів у собак».

Дипломна робота викладена згідно методичних рекомендацій з написання дипломної роботи спеціальності 211 «Ветеринарна медицина», ступеня вищої освіти «Магістр». Вона складається зі вступу, огляду літератури, власних досліджень, їх аналізу, висновків, аналізу використаних джерел. Праця виконана на 73 сторінках комп'ютерного тексту, в ній міститься 11 рисунків і 5 таблиць.

Характер роботи: експериментальний.

Предмет дослідження: собаки алергічними дерматозами.

Об'єкт дослідження: діагностика та лікування собак з алергічними дерматозами.

Результати досліджень: алергічні дерматози у собак реєструвалися у 76% випадків всіх патологій шкіри. Діагностика алергічних дерматозів проводилася на основі даних анамнезу, клінічних та дерматологічних досліджень, при цьому виключали дерматити заразного походження. Крім того, застосовували диференційну діагностику алергічних дерматозів. Основними симптомами всіх дерматозів були: сильний свербіж, еритема, поліморфні висипи, алопеції, ліхенізація та зміна кольору різних ділянок шкіри.

Для лікування собак із блошиним алергічним дерматитом використовували обробку їх проти бліх препаратами «Адвокат» або «Стронхолд», для припинення свербіжів – преднізолону у таблетках у дозі 0,5 мг/кг один раз в день протягом 7 днів, що сприяло одужанню тварин; для профілактики захворювання рекомендовано проводити обробку проти ектопаразитів щомісячно. При контактному алергічному дерматиті видаляли

речовиною, що викликала алергію, ту, з якою контактувала собака, також призначали преднізолон по тій же схемі та купали тварину у шампуні із хлоргексидином, при мокнучих екземах застосовували мазь «Санодерм», тварини одужали; для профілактики патології рекомендовано виключити контакт тварин із речовинами, що викликали алергію. При аліментарному алергічному дерматиті переводили тварин на годівлю кормом «Anallergenic» фірми «Royal Canin» протягом 2 місяців, застосування «Апоквел» орально у дозі 0,4-0,6 мг/кг; для профілактики патології тваринам з рецидивами харчової алергії призначали пожиттєво корм «Hypoallergenic» фірми «Royal Canin»; тварини одужали. При атопічному дерматиті собак лікували преднізолоном у дозі 0,5 мг/кг протягом 1,5-2 місяці, застосовували купання у шампуні із хлоргексидином; при хронічній формі, (ускладненою піодермією або отитами) крім цього, амоксиклав у таблетках у дозі 25 мг/кг 4 тижня та краплі «Отоспектрин» при отитах; собаки одужали.

На основі проведених досліджень зроблені висновки.

Галузь використання – клініки ветеринарної медицини різних форм власності.