

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
КАФЕДРА ХІРУРГІЇ ТА АКУШЕРСТВА

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

Спеціальність 211 Ветеринарна медицина

Галузь знань 21 Ветеринарна медицина

Ступінь вищої освіти Магістр

ДОПУСКАЄТЬСЯ ДОЗАХИСТУ

Завідувач кафедри хірургії та акушерства,

професор Киричко Б.П.

_____ 2019 р.

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

**ТЕМА: «Ефективність перинеальної уретростомії за
лікування котів із уролітіазом»»**

ВИКОНАЛА ЗДОБУВАЧ ВИЩОЇ ОСВІТИ

НЕСТЕРЕНКО АЛІНА ВІТАЛІЇВНА

КЕРІВНИК МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Панасова Тетяна Георгіївна,

доцент кафедри хірургії та акушерства

Полтава 2019 р.

РЕФЕРАТ

Тема роботи: «Ефективність перинеальної уретростомії за лікування котів із уролітіазом».

Дипломна робота викладена згідно методичних рекомендацій з написання дипломної роботи спеціальності 211 «Ветеринарна медицина», СВО «Магістр». Вона складається зі вступу, огляду літератури, власних досліджень, їх аналізу, висновків та пропозицій, аналізу використаних джерел. Праця виконана на 83 сторінках комп'ютерного тексту, в ній міститься 15 рисунків і 10 таблиць.

Характер роботи: експериментальний.

Предмет дослідження: коти із уролітіазом.

Об'єкт дослідження: ефективність перинеальної уретростомії за лікування котів із уролітіазом.

Результати досліджень: схема консервативного лікування котів із уролітіазом, що складалася із катетеризації уретри та промивання сечового міхура 0,9% р-ном натрію хлориду, введення синулоксу 50 мг по 1 таблетці або синулоксу п/ш у дозі 1 мл/10 кг з інт. 24 години протягом 7 днів; дексакель у дозі 0,5 мл/5 кг в/м з інт. 24 години та бускопан по 0,5 мл п/ш з інт. 24 години протягом 7 днів. сприяла одужанню тварин на 7-8-й день; у 5 котів виявлено рецидив захворювання. Оперативне лікування – виконання перинеальної уретростомії та післяопераційного лікування: моваліс у кількості 0,2 мл з інт. 24 год. 2-3 дні, синулокс у дозі 1 мл/10 кг або кобактан у дозі 1 мл/10 кг маси п/ш з інт. 24 год. протягом 7 днів, бужування уретри та обробку швів після зняття уретрального катетера 2 рази в день протягом 7-8 днів сприяло одужанню всіх котів на 8-10-й день; рецидивів захворювання не виявлено. На основі проведених досліджень зроблені висновки та пропозиції.

Галузь використання – клініки ветеринарної медицини різних форм власності.