

**ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
КАФЕДРА ПАРАЗИТОЛОГІЇ ТА ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ**

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина
Рівень вищої освіти другий (магістерський)
Спеціальність 211 Ветеринарна медицина
Галузь знань 21 Ветеринарна медицина
Ступінь вищої освіти Магістр

ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ
Завідувач кафедри паразитології та
ветеринарно-санітарної експертизи,
д.вет.наук, професор
В.О. Євстаф'єва
«_____» _____ 2019 р.

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

**тема: «АМІДОСТОМОЗ ГУСЕЙ НА ТЕРИТОРІЇ МАШІВСЬКОГО
РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ПОШИРЕННЯ ТА
ЛІКУВАННЯ)»**

ВИКОНАВ ЗДОБУВАЧ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МІШУРА МАРІЯ СЕРГІЇВНА

КЕРІВНИК МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Михайлютенко Світлана Миколаївна,
кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри

Полтава 2019 року

РЕФЕРАТ

Магістерська дипломна робота викладена на 70 листах комп'ютерного друку, має 8 рисунків і 5 таблиць, список літератури включає 63 джерел.

Тема роботи: «Амідостомоз гусей на території Машівського району Полтавської області (поширення та лікування)».

Предмет дослідження – поширення амідостомозної інвазії, інтенсивність і екстенсивність інвазії, інтенс- та екстенсефективність лікарських засобів.

Метою роботи було встановити паразитологічну ситуацію в умовах фермерського господарства, запропонувати ефективні препарати з найпоширенішим захворюваннями.

Методи дослідження – клінічні, епізоотологічні, паразитологічні (копроовоскопічні), економічні та статистичні.

Лабораторними дослідженнями встановлено, що в умовах фермерського господарства в селі Миронівка зареєстровано амідостомоз. Екстенсивність інвазії становила 100 %. Результатами копроскопічних досліджень підтверджено циркуляцію збудника впродовж року. Ураженість гусей гельмінтами реєстрували з 1 місячного віку, екстенсивність інвазії склала 66,67%. ЕІ амідостомозної інвазії тримається на досить високому рівні у птиці віком до 10 місяців. Інтенсивність інвазії впродовж року невисока, варіювала в межах від 6,68 до 10,4 екз.кр. У ході вивчення терапевтичної ефективності препаратів групи левамізол виявлено досить високу їх ефективність ($EE=83,33-100\%$) за амідостомозу гусей.

Отримані дані допомогли оновити заходи боротьби з амідостомозом гусей в умовах фермерсько-селянських господарств.

Галузь використання роботи – ветеринарна медицина: одержані результати досліджень стали науковим обґрунтуванням для розробки заходів боротьби з гельмінтозами собак в умовах урбанізованих міст.