

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
КАФЕДРА ПАРАЗИТОЛОГІЇ ТА ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина
Рівень вищої освіти другий (магістерський)
Спеціальність 211 Ветеринарна медицина
Галузь знань 21 Ветеринарна медицина
Ступінь вищої освіти Магістр

ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ
Завідувач кафедри паразитології
та ветеринарно-санітарної експертизи
доктор вет. наук, професор
В. О. Євстаф'єва
«__» _____ 2019 р.

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

тема: «ТРИХУРОЗ СОБАК В УМОВАХ МІСТА ЛУБНИ
(ПОШИРЕННЯ, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ)»

ВИКОНАВ ЗДОБУВАЧ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ПАВЛИК БОГДАН ВІКТОРОВИЧ

КЕРІВНИК МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Євстаф'єва Валентина Олександрівна

доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри

Полтава 2019 р.

РЕФЕРАТ

Магістерська дипломна робота викладена на 70 листках комп'ютерного друку, ілюстрована 13 рисунками та фотографіями, містить 8 таблиць, список літератури включає 83 джерела.

Тема магістерської дипломної роботи – «Трихуроз собак в умовах міста Лубни (поширення, діагностика та лікування)».

Об'єкт дослідження: трихуроз собак.

Предмет дослідження: поширення, вікова динаміка, породна сприйнятливність собак за трихуро́зу; діагностична ефективність методів копроовоскопії; ефективність антигельмінтних препаратів.

Мета роботи полягала у вивченні поширення трихуро́зу собак у місті Лубни, визначенні діагностичної ефективності методів копроовоскопії та терапевтичної ефективності антигельмінтних препаратів за трихуро́зу.

В результаті проведених досліджень встановлено, що екстенсивність трихуро́зної інвазії у собак на території міста Лубни становить 36,4 %, а інтенсивність інвазії коливається в межах від 1 до 34 яєць. Визначено, що ступінь інвазованості собак збудником трихуро́зу залежить від віку тварин. Високу ступінь інвазованості собак *Trichuris vulpis* спостерігали у молодих собак віком від 6 до 12 місяців, екстенсивність інвазії становить 58,3 %. Виявлено певну залежність інвазованості собак збудником трихуро́зу від породи.

З'ясовано, що одним із найбільш ефективних методів флотації для виявлення яєць *Trichuris vulpis* є метод з використанням карбаміду.

Експериментально встановлено, що за трихуро́зу собак найефективнішими виявилися антигельмінтні препарати прازیцид суспензія та каніквантел плюс (екстенсефективність та інтенсефективність становили 100 %).

Галузь використання – ветеринарна медицина.