

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
КАФЕДРА ХІРУРГІЇ ТА АКУШЕРСТВА

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина

Спеціальність 211 Ветеринарна медицина

Ступінь вищої освіти Магістр

ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри, професор

_____ Борис Киричко

« ____ » _____ 2020 р.

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

тема: «Діагностика та лікування зовнішніх отитів у собак»

ВИКОНАВ: ЗДОБУВАЧ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ТОЛМАЦ АННА ОЛЕКСАНДРІВНА

КЕРІВНИК МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Тетяна Панасова

Полтава, 2020 р.

РЕФЕРАТ

Тема роботи: «Діагностика та лікування зовнішніх отитів у собак».

Дипломна робота викладена згідно методичних рекомендацій з написання дипломної роботи спеціальності 211 «Ветеринарна медицина», ступеня вищої освіти «Магістр». Вона складається зі вступу, огляду літератури, власних досліджень, їх аналізу, висновків, аналізу використаних джерел. Праця виконана на 78 сторінках комп'ютерного тексту, в ній міститься 15 рисунків і 4 таблиць.

Характер роботи: експериментальний.

Предмет дослідження: собаки із зовнішніми отитами.

Об'єкт дослідження: діагностика та лікування собак із зовнішніми отитами.

Результати досліджень: зовнішні отити у собак реєструвалися у 94,4% всіх отитів. Первинною причиною ЗО : надлишкова кількість вологи у слуховому проході, надмірне накопичення у вушному каналі сірки, травми, сторонні тіла, алергічні реакції, а також кліщ *Otodectes cynotis*. Діагностика ЗО проводилася на основі даних анамнезу, клінічних та лабораторних досліджень (цитологічних та культуральних). Основними симптомами зовнішніх отитів були: сильні болючість, свербіж, еритема, поліморфні висипи (при отитах алергічної етіології), наявність гнійного ексудату або кірочок темно-коричньового кольору (при отодектозі).

Для лікування собак із ЗО застосовували промивання вушних каналів мильним розчином, краплі «Отоспектрин» по 3-10 крапель (залежно від ваги собаки) щодня протягом 10-14 днів, таблетки «Енроксил» у дозі 15 мг/3кг маси собаки, 50 мг/10 кг та 150 мг/30 кг маси один раз на добу протягом 7-10 днів та «Дексафорт» 0,5-1 мл, за хронічної форми двічі з інтервалом 7 днів. Для лікування собак із отодектозом використовували «Дектомакс» у дозі 1 мл/16 кг тричі з інтервалом 7 днів. Всі піддослідні собаки одужали.

На основі проведених досліджень зроблені висновки.

Галузь використання – клініки ветеринарної медицини різних форм власності.