

**ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
КАФЕДРА ПАРАЗИТОЛОГІЇ ТА ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ**

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина
Рівень вищої освіти другий (магістерський)
Спеціальність 211 Ветеринарна медицина
Галузь знань 21 Ветеринарна медицина
Ступінь вищої освіти Магістр

ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ
Завідувач кафедри паразитології та
ветеринарно-санітарної експертизи
доктор ветеринарних наук, професор
_____ Євстаф'єва В. О.
«_____» _____ 2019 р.

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

**тема: «ШЛУНКОВО-КИШКОВІ СТРОНГІЛЯТОЗИ ВЕЛИКОЇ
РОГАТОЇ ХУДОБИ В УМОВАХ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ
С.ЧЕРЕВКИ ОРЖИЦЬКОГО РАЙОНУ (ПОШИРЕННЯ,
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ)»**

ВИКОНАВ ЗДОБУВАЧ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ГОРОВА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

КЕРІВНИК МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Кручиненко Олег Вікторович,

кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри

Полтава 2019 р.

РЕФЕРАТ

Дипломна робота викладена на 58 листах тексту комп'ютерного друку і має 2 рисунки, 1 таблицю, список літератури включає 66 літературних джерел.

Тема роботи: «Шлунково-кишкові стронгілятози великої рогатої худоби в умовах приватного сектору с. Черевки, Оржицького району (поширення, діагностика та лікування)».

Об'єкт досліджень: корови, ураженні шлунково-кишковими стронгілятами й нематодірусами.

Предмет дослідження – екстенсивність стронгілятами шлунково-кишкового каналу корів; сезонна динаміка нематодозів корів; терапевтична ефективність лікування за гельмінтозів корів.

Мета роботи полягала у вивченні епізоотичної ситуації та лікуванні корів за нематодозів у с. Черевки Оржицького району Полтавської області.

У власних дослідженнях в доступній формі викладені матеріали й методи досліджень.

В результаті досліджень нами встановлено, що пік інвазії припадає на осінній період (екстенсивність інвазії шлунково-кишковими стронгілятами восени становить 22,5 %, а нематодірусами – 13,75 %).

З'ясовано, що показники ЕІ взимку й весною знижуються.

Встановлено, що бронтел 10 % й трематозол у терапевтичних дозах за шлунково-кишкових стронгілят, нематодірусів у корів проявляють 100 % екстенс- та інтенсефективність.

Економічна ефективність на 1 грн. витрат після застосування бронтелу 10 % становить 17,4 грн, а трематозолу – 0,8 грн.

Галузь використання роботи – ветеринарна медицина: одержані результати досліджень стали науковим обґрунтуванням для розробки ефективного лікування великої рогатої худоби у с. Черевки Оржицького району Полтавської області.