

**ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
КАФЕДРА ПАРАЗИТОЛОГІЇ ТА ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ**

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина
Рівень вищої освіти другий (магістерський)
Спеціальність 211 Ветеринарна медицина
Галузь знань 21 Ветеринарна медицина
Ступінь вищої освіти Магістр

ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ
Завідувач кафедри паразитології та
ветеринарно-санітарної експертизи,
д.вет.наук, професор
В.О. Євстаф'єва
«_____» _____ 2019 р.

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

**тема: «ОТОДЕКТОЗ СОБАК В УМОВАХ МІСТА ПОЛТАВИ
(ПОШИРЕННЯ, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ)»**

ВИКОНАВ ЗДОБУВАЧ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОВДІЄНКО АННА ВЛАДИСЛАВІВНА

КЕРІВНИК МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Михайлютенко Світлана Миколаївна,

кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри

Полтава 2019 року

РЕФЕРАТ

Магістерська дипломна робота викладена на 70 листах комп'ютерного друку, має 3 рисунки і 5 таблиць, список літератури включає 64 джерел.

Тема роботи: «Отодектоз собак в умовах м. Полтави (поширення, діагностика та лікування)».

Предмет дослідження – поширення отодектозу, інтенсивність і екстенсивність інвазії, інтенс- та екстенсефективність лікарських засобів.

Метою роботи було встановити паразитологічну ситуацію в умовах міста Полтави, запропонувати ефективні препарати за отодектозу.

Методи дослідження – клінічні, епізоотологічні, паразитологічні (копроовоскопічні), економічні та статистичні.

Лабораторними дослідженнями встановлено, що в умовах міста Полтави реєструється отодектоз собак. Екстенсивність інвазії становила 33,68 %. Доведено, що рівень інвазованості собак збудником отодектозу залежить від їх віку. Так, найбільш ураженими виявилися цуценята до 6 місяців (ЕІ – 37,93%) та собаки старші 6-річного віку (ЕІ – 38,1%). Слід зазначити, що найбільш сприятливими були собаки порід кокер-спанієль та німецька вівчарка (ЕІ – 40,0 %). Разом з тим реєстрували нижчий ступінь інвазованості отодектесами у цуценят 6-12 місяців. Щодо статеві сприйнятливості до отодектозу, то серед хворих найбільший відсоток займали суки (53,13%).

У ході вивчення терапевтичної ефективності протиакарицидних препаратів виявлено 100 % ефект у разі використання анандину плюс за отодектозу собак. На 14 добу дослідження ЕЕ, ІЕ склала – 100 %.

Отримані дані допомогли оновити заходи боротьби з акарозами собак в умовах урбанізованих міст.

Галузь використання роботи – ветеринарна медицина: одержані результати досліджень стали науковим обґрунтуванням для розробки заходів боротьби з акарозами собак в умовах урбанізованих міст.