

УДК: 636.8.09:61 6.31-002-084:615

«ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТИТУ У КОТА СВІЙСЬКОГО»

Влох Ілона Юріївна, здобувач вищої освіти СВО «Магістр» 4 курс

Терезія Петрівна Локес-Крупка – канд. вет. наук, доцент, завідувач кафедри терапії імені професора П.І.Локеса

Полтавський державний аграрний університет

Стоматит – запалення слизової оболонки ротової порожнини. Може бути дифузним, коли уражується вся слизова оболонка, і вогнищевим, коли пошкоджуються окремі її ділянки (ясна, язик, піднебіння та ін.). За походженням стоматит буває первинним і вторинним, за характером ураження слизової оболонки – ексудативним й альтеративним (виразковий, гангренозний) [1].

Основними етіологічними факторами стоматиту у свійських котів є: споживання гарячого корму, травмування кістками, хімічні опіки, відсутність гігієни ротової порожнини.

Як вторинна патологія, стоматит розвивається на тлі панлейкопенії, кальці вірусної інфекції, ендокринної патології (цукровий діабет), грибкових уражень та ін. [2].

Також розвитку стоматиту сприяють аутоімунні хвороби, імунодефіцитні стани або лейкоз [3].

За даними літератури можна визначити основні клінічні прояви хвороби. Із не специфічних симптом реєструють гіпорексію, порушення акту прийому корму і його пережовування, гіперсалівація, пригнічення, за некротичного стоматиту - неприємний запах із рота. Катаральний стоматит є здебільшого початковим етапом інших форм ураження слизової оболонки (виразкового, везикулярного, афтозного, флегмонозного, гангренозного). [3]

Лікування свійського kota за стоматиту має бути комплексним і першочергово спрямованим на усунення головного етіологічного чинника. Рекомендована дієта, сухий промисловий корм замінюють консервами, їх можна трохи розводити теплою водою до кашоподібної консистенції. За натурального раціону м'ясне пюре, муси, бульйони [1].

Для місцевої обробки ротової порожнини використовують: відвари трав (квіти ромашки, листя шавлії, календули) 1-5%-й розчин протарголу, 0,02-0,05%-й розчин фурациліну, 2-5% -й коларголу, 0,2-0,5%-й цинку сульфату, 0,25-0,5%-й міді сульфату, 0,1-0,2%-й етаклідіна лактату, 1-2%-й резорцину, 0,5-1%-й галун алюмінію, 1-2%-й таніну або натрію гідрокарбонату. Як етіотропну терапію застосовують місцево на уражену ділянку гель «Метрагіл дента» і «Ваготил». За необхідності використовують антибіотико терапію, залежно від чутливості [4].

Отже, стоматит у свійського kota є поширеною патологією, що досить легко піддається діагностиці. Перебіг хвороби за своєчасного лікування -

сприятливий. Основними методами лікування є місцеві оброки протизапальними розчинами та антибіотикотерапія.

Література

1. Чандлер Э.А., Гаскелл К.Дж., Гаскелл Р.М. Болезни кошек. перевод з англ. Москва, 2002. 696 с.
2. Bloom C. A., Rand J. Feline diabetes mellitus: clinical use of long-acting glargine and detemir. *J Feline Med Surg.* 2014. Vol. 16(3). P. 205–215. doi: 10.1177/1098612X14523187.
3. Зимин, Н. Л. Эндокринология в практической ветеринарии. *Ветеринарный консультант.* 2005. № 17. С. 10-15.
4. Lederer R. Rand J. S. , Hughes I. P. et al. Chronic or recurring medical problems, dental disease, repeated corticosteroid treatment, and lower physical activity are associated with diabetes in Burmese cats. *J. Vet. Intern.Med.* 2003; Vol. 17: 433.